

# 「出産予定日 12 週以内の妊婦」の記載理由



2024年9月20日現在

## • イブプロフェンの理由 (医療用添付文書 9.5 妊婦 9.5.1 妊娠後期の女性)

投与しないこと。妊娠後期のラットに投与した実験で、**胎児の動脈管収縮**が報告されている。また、他の解熱鎮痛消炎剤を妊娠後期に投与したところ、**胎児循環持続症**(PFC)が起きたとの報告がある。

## • アスピリンの理由 (医療用添付文書 9.5 妊婦 9.5.1 出産予定日 12 週以内の妊婦)

投与しないこと。**妊娠期間の延長、動脈管の早期閉鎖、子宮収縮の抑制、分娩時出血の増加につながるおそれがある**。海外での大規模な疫学調査では、妊娠中のアスピリン服用と先天異常児出産の因果関係は否定的であるが、長期連用した場合は、母体の貧血、**産前産後の出血**、分娩時間の延長、難産、死産、新生児の体重減少・死亡などの危険が高くなるおそれを否定できないとの報告がある。また、ヒトで妊娠末期に投与された**患者及びその新生児に出血異常**があらわれたとの報告がある。さらに、妊娠末期のラットに投与した実験で、弱い**胎児の動脈管収縮**が報告されている。



◎出生後の血圧  
体循環 = 120mmHg  
肺循環 = 20mmHg

◎胎児の血圧  
体循環 = 低い(逆流は困る) **左右心室の厚みの違いに注目！**

肺循環 = **肺血管が収縮、血流抵抗が大きい** ⇒ 動脈管から体循環へ



## 新型コロナウイルス感染症の 罹患後症状(いわゆる後遺症)に関するQ&A

### Q1 COVID-19の罹患後症状とは何ですか。

令和5年 10月 20日改訂

A COVID-19の罹患後症状は、COVID-19に罹患した後に、**感染性は消失したにもかかわらず、他に原因が明らかでなく、罹患してすぐの時期から持続する症状、回復した後に新たに出現する症状、症状が消失した後に再び生じる症状の全般**をさしています。(通常は発症から3カ月経った時点にもみられる)

### Q2 罹患後症状の代表的な症状にはどのような症状がありますか。

A 代表的な罹患後症状は、**疲労感・倦怠感、関節痛、筋肉痛、咳、喀痰、息切れ、胸痛、脱毛、記憶障害、集中力低下、頭痛、抑うつ、嗅覚障害、味覚障害、動悸、下痢、腹痛、睡眠障害、筋力低下**などがあります。


### Q14 罹患後症状が続く場合、活用できる支援制度はありますか。

A 罹患後症状によって社会生活に大きな制限が生じた場合には、**労災保険、健康保険の傷病手当金、障害年金、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳の対象となりうる他、生活にお困りの方には生活困窮者自立支援制度において相談支援等**を実施します。

## 小児に発熱と発疹がみられたら

学校感染症の指定、病歴把握の観点からも受診が望ましい。

- 川崎病(右図)、風疹(3日ばかり)、水痘(水疱瘡)、猩紅熱など
- 川崎病は、主に4歳以下の小児に発熱と発疹が生じ、口唇の紅潮と莓舌、両眼球結膜の充血、頸部リンパ節腫脹等を伴う。冠動脈瘤ができると、狭心症や心筋梗塞のリスクが高まり、手術や永続的な管理が必要になる。



# 大きい子(17歳)の手足口病

• 7月18日

四男17歳。突然、39.7度の熱が出て、インフルエンザかと思われ、漢方薬で対応。

• 7月19日

汗が出て、翌日にはほぼ症状が消失。発熱外来で検査するも新型コロナのみの検査で陰性。

• 7月20日

同じ部屋で生活している二男22歳が発熱。「コロナ並みのつらさ」と言っていたが、発熱外来で新型コロナ、インフルエンザとも陰性。

• 7月21日

四男、手と足にブツブツできて痛い。足は一見、水疱性足白癬かとも思えたが、発症部位としては疑わしい。それぞれ単純に湿疹かとも・・・

• 7月22日

四男、皮膚科を受診。ドクターの診断を覚えておらず、「口にもできるかもしれないとか言っていた」と。そこで、「手足口病？」と訊くと、「そう！」と。



# 小さい子(7歳男児)の手足口病



# 小さい子(7歳男児)の手足口病



# 小さい子(7歳男児)の手足口病

